INCIDENCIA DE CONDUCTAS SUICIDAS EN PACIENTES ASISTIDOS EN EL AÑO 2017 EN EL "SERVICIO DE SALUD MENTAL EN DESÓRDENES DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO" DEL HOSPITAL BORDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. *Póster*

Persano, Humberto L.; González Stivala, Ernesto; Mora, Stella M.; Gutnisky, David A.; Ventura, Adrián D.

hpersano@gmail.com

Unidad Académica Hospital José T. Borda

Abstract

Son frecuentes en pacientes con trastornos alimentarios (TCA) las conductas suicidas y parasuicidas.

Material y Método: Este trabajo es un estudio exploratorio, transversal sobre pacientes asistidos en un servicio especializado en CABA, en el 2017. Forma parte del Proyecto UBACYT 20020150200158BA, programación científica 2016.

Muestra 88 pacientes (n=88) 77 mujeres y 11 hombres, asistidos con diagnóstico de TCA, de acuerdo con los criterios diagnósticos de: GLADP; CID-10; DSM-V y mediana de edad: 19 años.

Resultados: Se encontró que 28 pacientes (31,81%) presentaron antecedentes de haber intentado cometer suicidio en al menos una oportunidad, 19 de los pacientes (21,59%) presentaron antecedentes de ideación suicida y 14 (15,90%) presentaron gestos suicidas. 5 pacientes presentaron solamente ideación suicida y 2 pacientes sólo gestos suicidas y 14 de ellos intentaron cometer suicidio sin ideación o gestos previos. Sobre los 28 casos observados la frecuencia de intentos de suicidio fue: 46,42% tuvo 1 intento, el 32,14% tuvo entre 2 y 4 intentos, 14,28% tuvieron más de 5 y menos de 10 y 7,14% tuvieron más de 10 intentos de suicidio.

Conclusiones: El 39,77% de la muestra presentó al menos una de las variables estudiadas: gestos, ideación e intentos suicidas; lo cual representa un riesgo muy significativo para población de menos de 20 años de vida y una

complicación severa en la evolución de los pacientes con TCA. Si se suman los riesgos de muerte por complicaciones clínicas a estas variables el riesgo de mortalidad para esta patología es muy alto, tal como se ha evaluado a nivel mundial.

Bibliografía

- 1. Koutek, J., Kocourkova, J., & Dudova, I. (2016). Suicidal behavior and self-harm in girls with eating disorders. *Neuropsychiatric disease and treatment*, *12*, 787.
- 2. Noma, S. I., Uwatoko, T., Ono, M., Miyagi, T., & Murai, T. (2015). Differences Between Nonsuicidal Self-Injury and Suicidal Behavior in Patients With Eating Disorders. *Journal of Psychiatric Practice*®, *21*(3), 198-207.
- Zerwas, S., Larsen, J. T., Petersen, L., Thornton, L. M., Mortensen, P. B., & Bulik, C. M. (2015). The incidence of eating disorders in a Danish register study:
 Associations with suicide risk and mortality. *Journal of psychiatric research*, 65, 16-22.
- 4. Kostro, K., Lerman, J. B., & Attia, E. (2014). The current status of suicide and self-injury in eating disorders: a narrative review. *Journal of eating disorders*, *2*(1), 19.
- Nock, M. K., Green, J. G., Hwang, I., McLaughlin, K. A., Sampson, N. A., Zaslavsky, A. M., & Kessler, R. C. (2013). Prevalence, correlates, and treatment of lifetime suicidal behavior among adolescents: results from the National Comorbidity Survey Replication Adolescent Supplement. *JAMA psychiatry*, 70(3), 300-310.
- 6. Smink, F. R., Van Hoeken, D., & Hoek, H. W. (2012). Epidemiology of eating disorders: incidence, prevalence and mortality rates. *Current psychiatry reports*, *14*(4), 406-414.
- Swanson, S. A., Crow, S. J., Le Grange, D., Swendsen, J., & Merikangas, K. R. (2011). Prevalence and correlates of eating disorders in adolescents: Results from the national comorbidity survey replication adolescent supplement. *Archives of general psychiatry*, 68(7), 714-723.
- 8. Franko, D. L., & Keel, P. K. (2006). Suicidality in eating disorders: occurrence, correlates, and clinical implications. *Clinical psychology review*, *26*(6), 769-782.

Palabras Clave: TCA, Conductas suicidas, intentos de suicidio, ideación suicida