INTOXICACIÓN MEDICAMENTOSA: RIESGO SUICIDA EN MENOR DE EDAD.

Póster

Cortez Analia E.; Dozoretz Daniel ; Damin Carlos F.

acortez@fmed.uba.ar

Departamento de Farmacología y Toxicología, Primera Cátedra de Toxicología. Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires; División Toxicología, Hospital Juan A. Fernández.

RESUMEN:

Se presenta un caso clínico de una paciente de 14 años, que ingresa a la guardia del Hospital Fernández acompañada por sus familiares tras la ingesta de Ácido valproico en intento de suicidio. Como antecedentes presentaba un trastorno psiquiátrico no específico e hipotiroidismo en tratamiento médico con levo tiroxina. Presentaba intentos de suicidio previos, se auto infligió cortes en muñeca derecha. La ingesta fue de *Valcote R* en dosis de 30 comprimidos (7500 mg). Se realizó tratamiento con las medidas iniciales de sostén, carbón activado, L-carnitina e hidratación parenteral con buena tolerancia y evolución. Presentamos en esta oportunidad un caso clínico que evidencia dos aspectos preocupantes para el médico, en primer lugar el descenso en la edad de intentos de suicidio, en la bibliografía encontramos cuadros similares a partir de los 8 años; en segundo lugar el acceso a psicofármacos en pacientes con antecedentes de cuadros previos. En este caso el riesgo de hepatotoxicidad por las características del fármaco empleado, se agrega la particularidad de la liberación prolongada que puede retrasar y empeorar la evolución si no se inicia de manera precoz el tratamiento específico.

Palabras clave: ácido valproico, suicidio, intoxicación medicamentosa